

KUKORICA | NAPRAFORGÓ | CIROK

20
ÉVE

26
VETŐMAG
KATALÓGUS

EGYÜTT A MAGYAR
GAZDÁKKAL



think
SOLUTIONS
think RAGT

„KÖSZÖNJÜK A MAGYAR GAZDÁK BIZALMÁT,
AMELLEL AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN
MEGTISZTELTEK BENNÜNKET!”

SÍK IMRE
COUNTRY MANAGER



TISZTELT PARTNEREINK!

A 2026-OS ÉV KÜLÖNLEGES MÉRFÖLDKŐ A RAGT VETŐMAG KFT. ÉLETÉBEN: **20 ÉVE, 2006-BAN KEZDTÜK MEG MŰKÖDÉSÜNKET MAGYARORSZÁGON.**

EZ A KÉT ÉVTIZED OLYAN IDŐSZAK VOLT, AMELYBEN SZÁMTALAN KIHÍVÁSSAL ÉS VÁLTOZÁSSAL NÉZETT SZEMBE A HAZAI MEZŐGAZDASÁG – AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEKTŐL A PIACI INGADOZÁSOKON ÁT A NÖVEKVŐ SZAKMAI ELVÁRÁSOKIG. BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, HOGY MINDVÉIG PARTNEREINK MELLETT ÁLLHATTUNK, ÉS **VETŐMAGJAINK BIZONYÍTOTTÁK ÉRTÉKÜKET A MAGYAR FÖLDEKEN.**

A **RAGT** NEM CSAK A HAZAI, HANEM NEMZETKÖZI SZINTEN IS **STABIL, MEGBÍZHATÓ SZEREPLŐ:** A VÁLLALAT A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBAN SZOLGÁLJA A GAZDÁLKODÓKAT ÉS EZ A TÖBB ÉVTIZEDES SZAKMAI HÁTTÉR ADJA A BIZTOS ALAPOT, AMELYRE MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉGÜNKET IS ÉPÍTJÜK. **PORTFÓLIÓNK** A DELEPLANQUE BEOLVADÁSÁVAL **ÚJ KULTÚRÁKKAL**, ÍGY PL. A CUKORRÉPÁVAL IS **GAZDAGODIK**, AMI ÚJ LEHETŐSÉGEKET ÉS MÉG NAGYOBB STABILITÁST JELENT PARTNEREINK SZÁMÁRA.

AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN A RAGT KUKORICA-, NAPRAFORGÓ- ÉS CIROKFAJTÁI EGYARÁNT HOZZÁJÁRULTAK A HAZAI TERMELŐK EREDMÉNYESSÉGÉHEZ. A SZÉLSŐSÉGES KLIMATIKUS VISZONYOK, AZ ASZÁLY ÉS A GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE FAJTÁINK TELJESÍTMÉNYE ÉS STABILITÁSA BIZONYÍTOTTA: **JÓ ÚTON JÁRUNK.**

CÉGÜNK FILOZÓFIÁJÁNAK KÖZÉPPONTJÁBAN A **PARTNERSÉG ÉS A SZAKMAISÁG** ÁLL. HISZÜNK ABBAN, HOGY CSAK KÖZÖSEN, EGYMÁS TAPASZTALATAIRA ÉPÍTVE TUDUNK HOSSZÚ TÁVÚ SIKEREKET ELÉRNİ. A KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE FORDÍTOTT FOLYAMATOS FIGYELEM, VALAMINT A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK BEÉPÍTÉSE BIZTOSÍTJA, HOGY A RAGT VETŐMAGJAI A KÖVETKEZŐ ÉVTIZEDEKBEN IS A LEGJOBB VÁLASZTÁST JELENTSÉK.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR GAZDÁK BIZALMÁT, AMELLEL AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN MEGTISZTELTEK BENNÜNKET.

TISZTELETTEL,

SÍK IMRE
COUNTRY MANAGER

KUKORICA INNOVÁCIÓK

KUKORICA KÍNÁLAT

DUO
WAXY
SZEMES
KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ
SILÓ

NAPRAFORGÓ INNOVÁCIÓK

NAPRAFORGÓ KÍNÁLAT


BIO
LINOLSAVAS
MAGASOLAJSAVAS

CIROK KÍNÁLAT

SZEMES
SILÓ

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT


100 ÉV TÖRTÉNELEM – 70 ÉV NÖVÉNYNEMESÍTÉS



AZ RAGT LEÁNYVÁLLALATAI A VILÁGBAN:

1 RAGT Semences	6 RAGT Polska	11 RAGT Nordics	16 RAGT New-Zealand
2 RAGT Saaten Deutschland	7 RAGT Vetőmag Kft.	12 RAGT Seminte	17 RAGT Australia
3 RAGT Österreich	8 RAGT Seeds	13 RAGT Semences-Ukraine	18 RAGT Argentina
4 RAGT Benelux	9 RAGT Czech	14 RAGT Italia	19 GUERRAGT
5 Joordens Zaden	10 RAGT Iberica	15 Les Gazons de France	20 RAGT Beijing

AZ RAGT TÖRTÉNETE:



MIÉRT VÁLASSZA AZ RAGT-T?



MAGAS SZAKÉRTELEM

32 faj nemesítésével célunk a fenntartható mezőgazdaság támogatása.



ELLENÁLLÓ FAJTÁK

Számos fajtánk képes önállóan védekezni a környezeti stressz és egyéb kihívások ellen.



KIEMELT TALAJVÉDELEM

Zöldtrágyanövény-nemesítési programjaink magas hozzáadott értéket és új technikai megoldásokat kínálnak a modern mezőgazdasági kihívások kezelésére.



HATÉKONYSÁG, TELJESÍTMÉNY

Fajtáink nemesítésénél nemcsak a gazdák igényeit vesszük figyelembe, hanem az ellátási lánc további célkitűzéseit is, - beleértve az olaj-, fehérje-, malátázási, búza- és durumbúza követelményeket - amelyek stabil és megbízható teljesítményt biztosítanak.



PARTNERSÉGI KULTÚRA

Partnerséget építünk ki a mezőgazdasági szereplők között, összekötve a szektor minden résztvevőjét.

| KUKORICA





#THINKSOLUTIONSTHINKRAGT

THINK SOLUTIONS THINK RAGT



secure density




fortify
FEED - STIMULATE - PROTECT




vigor plus

INNOVATÍV TŐSZÁM-OPTIMALIZÁCIÓ




Flexibilis csőtípus, pl. RGT ZANETIX, RGT DRAGSTER, RGT PALAWAN

A hibrid terméshozama nem függ jelentős mértékben a tőszámtól. Gyengébb vagy szárazabb adottságú területeken is képes kompenzálni a hibrid az ezermagtömegével, még akkor is, ha a termékenyülés gyengébb.



Klasszikus csőtípus, pl. RGT EXACT, RGT TEXERO, RGT URBANIX, RGT MEXINI

A hibrid terméshozama a tőszámmal együtt növekszik, amíg el nem éri az optimumot, amelyen túl a terméshozam elmarad, vagy akár kissé csökken is. Korlátozott adottságok között a reakció hasonló, de ilyen helyzetben az optimum alacsonyabban van.



Fix csőtípus, pl. RGT OXANDRO, RGT HEXXAGONE, RGT EXEMPLAIR, RGT HUXXO

A terméshozam optimális körülmények között a tőszám növekedésével egyenesen arányosan növekszik. Ezek a hibridek kiemelkedő szárstabilitással bírnak, és különösen ajánlottak öntözött viszonyok között történő termesztésre.

INNOVATÍV VETŐMAGCSÁVÁZÁS

A fortify egy olyan biostimulátor készítmény, amely speciálisan a kukorica igényeire szabva, humin- és fulvosavak optimális keverékéből tevődik össze.

A formuláció stabilitása lehetővé teszi a különböző vetőmagkezelésekkel, mint például rovarölő és/vagy gomabőlő hatóanyagokkal való összeférhetőségét. Ezáltal nem csak a kelésének és fejlődésének intenzitását javíthatjuk, de a kórokozók, kártevőkkel szembeni teljeskörű védelmet is biztosíthatjuk a növényünk számára.

Miben lehet a segítségünkre a fortify?

- ✓ Felgyorsítja a mag csírázási sebességét.
- ✓ Serkenti a gyökérzet fejlődését, így fokozza a víz és a tápanyagok felvehetőségét. A maghoz és a kezdeti gyökerekhez közeli tápanyagellátás pedig lehetővé teszi a nehezebb vetési körülményekhez való könnyebb alkalmazkodás és a kelés hatékonyságának növelését.
- ✓ Lehetővé teszi az egészséges, erőteljes növények termesztését, amelyek jobban tolerálják a biotikus, abiotikus stresszhatásokat, ezáltal jobb kondíciót és jobb hozamot biztosítanak.



Kontroll



fortify

RAGT „GOLD EDITION” fortify csávázással is elérhető hibridek!

- ✓ RGT ALEXX
- ✓ RGT TEXERO

- ✓ RGT OXANDRO
- ✓ RGT URBANIX

INNOVATÍV ÁLLOMÁNYINDULÁS

A különösen jó fiatalokori fejlődés és a nagyon homogén növényfejlődés előnyeit egyesítő kukoricafajtákat a RAGT a „VIGORplus” emblémával jelöli, miután ezen hibridek három éven keresztül, különböző termesztési körülmény között végzett kísérletekben is bizonyították erőteljes indulásukat és egyenletes kelésüket.

- ✓ akár 2000 db életképes növényrel több lehet hektáronként
- ✓ kártevőkkel (pl. drótféreg, kukoricabogár, madár) szemben való kisebb kitettség
- ✓ kedvező fejlődési erély és homogenitás a teljes tenyészidőszak alatt:
 - nagyobb rugalmasság a vetésideőszakban
 - az átlagosnál gyorsabb vegetatív növényfejlődés
 - gyorsabb sorok közötti lefedettség, sortakarás
 - gyorsabb és egyenletesebb érés és vízleadás



Kontroll



vigor plus



INNOVATÍV MEGOLDÁS A KUKORICA GYOMIRTÁSBAN

A Duo System egy két részből álló gyomirtási rendszer. Egyik eleme a Focus® Ultra ellenálló kukoricahibrid vetőmag, a másik a szuperszelektív egyszikűek elleni gyomirtó szer, a Focus® Ultra.

Klasszikus nemesítési módszerekkel sikerült olyan kukoricavonalakat, majd ezekből hibrideket előállítani, amelyek a szuperszelektív egyszikűirtók közül a ciklo-xidim hatóanyagú Focus® Ultrát károsodás nélkül képesek elviselni.

A megkülönböztethetőség érdekében a Duo vetőmagot tartalmazó zsákokat mindig megjelölik a Duo System jelzéssel. Focus® Ultrával csak az ilyen jelzésű vetőmagból származó kukorica állomány kezelhető. A ciklo-xidim-ellenálló kukoricák más szuperszelektív egyszikűirtókkal szemben nem ellenállóak, azokkal nem kezelhetők, mert maradandó károsodást szenvednek.



INNOVATÍV MEGOLDÁS A STRESSZTŰRÉSBEN

A klímaváltozás és az időjárási szélsőségek miatt a kukoricatermesztés komoly kihívásokkal néz szembe.

Kukoricanevelőink évek óta fejlesztenek olyan hibrideket, amelyek képesek adaptálódni a korlátozott vízfelvételi környezethez.

A stressztűrő H₂O termékcsalád genetikailag hatékony megoldást jelent a stresszes, vízhiányos állapotban.



INNOVATÍV ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁS KIHÍVÁSAIRA

Az elmúlt évek szélsőségeinek köszönhetően egyre kiszámíthatatlanabbá vált a kukoricatermesztés. Kevesebb, mint tíz év alatt a legmagasabb és a legacsonyabb termésrekordok is megdőltek.

Az OplIt termékcsaládon keresztül az RAGT azonosította a portfólión belül lévő legellenállóbb kukorica hibrideket. Ezek a hibridek kedvező években versenyképesek, de a nehéz években jobban tudnak alkalmazkodni a korlátozó tényezőkhez, mint a tavaszi hirtelen lehűlések, száraz, magas hőmérséklet vagy szélviharok által okozott veszteségek.

2022-ben a RAGT-kísérletekben – különösen a stresszes körülmények között – az OplIt hibridek 30%-kal magasabb terméshozammal múlták felül a nem stressztűrő hibrideket.

- TELJESÍTMÉNY
- HOMOGENITÁS
- AGRONÓMIAI BIZTONSÁG
- STRESSZTŰRÉS



RGT EXXKI DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



14



28-30



300-320 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Flexibilis	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület		<70	70
			Normál adottságú termőterület		70-100	70-75
					100-130	70-75
			Kiváló adottságú termőterület		>130	75

FAO 310-320

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kiváló termőképesség minden körülmények között

Nagyon jó szárszilárdság

Nagyon gyors vízleadás

Minden termőhelyre ajánlott

A korai vetést is jól tűri



RGT ZANETIXX DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



34-38



320-330 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Flexibilis	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület		<70	68
			Normál adottságú termőterület		70-100	68-72
					100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 340-350

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kiváló stressztűrés és termőhelyi stabilitás

Jó szárszilárdság

Nagyon jó csőegészség

A korai vetést is jól tűri



RGT KARTELO DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 8

CSŐ JELLEMZŐK



14-16



38-42



320-360 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Fix Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
	Gyenge adottságú termőterület		<70	65-68
	Normál adottságú termőterület		70-100	68-72
			100-130	72-75
Kiváló adottságú termőterület		>130		75-77

FAO 370-390

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Magas termőképesség minden termőhelyen
- Kiváló stressztűréssel rendelkezik
- Szabályos csőalakulás
- Megbízható termékenyülés
- Jól sűrítendő



RGT FUTURIXX DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16



38-40



340-360 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Klasszikus Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
	Gyenge adottságú termőterület		<70	65
	Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
			100-130	68-72
Kiváló adottságú termőterület		>130		72

FAO 380-390

SZEMES és SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Megbízható termőképesség
- Kiváló kezdeti fejlődés
- Nagyon jó betegség-ellenállóság



ÚJ RGT PRODUXXION DUO

FAO 390-410

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas-magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 8

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



28-30



310-340 g

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Kiemelkedő teljesítmény elsősorban az optimális termőhelyi adottságok között



AJÁNLOTT TŐSZÁM

		Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Cső típus: Klasszikus		Gyenge adottságú termőterület	<70	68
		Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
			100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület	>130	72

RGT HEXXAGONE DUO

FAO 400-420

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony
- Csőízesülés magassága alacsony

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16



32-36



360-380 g

FŐ JELLEMZŐI

Gyors kezdeti fejlődés


Biztonságos termés gyenge körülmények között is

Korai virágzás

Széles tőszám intervallum



AJÁNLOTT TŐSZÁM

		Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Cső típus: Fix		Gyenge adottságú termőterület	<70	65-68
		Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
			100-130	72-75
		Kiváló adottságú termőterület	>130	75-77

RGT ODILIXX DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas-magas
- Csöőzesülés magassága közép magas-magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



30-32



330-360 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
				70-100	65-68
		Normál adottságú termőterület		100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 410-430

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Impozáns csövek

Gyors vízleadás



RGT EXEMPLAIR DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csöőzesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



14-16



28-30



340-360 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Fix	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65-68
				70-100	68-72
		Normál adottságú termőterület		100-130	72-75
		Kiváló adottságú termőterület		>130	75-78

FAO 430-450

SZEMES és SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Szemes és siló hasznosítás

Homogén csövek

Jó kezdeti fejlődés

Korai virágzás



RGT CADIXXIO DUO

FAO 460-480

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 7
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 8

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



32-36



360-400 g

FŐ JELLEMZŐI

Kiváló termőképesség

Vastag cső, intenzív körülmények között a 20-22 soros csövek sem ritkák

Gyors kezdeti fejlődés

Erős szár



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Flexibilis	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

RGT VOLTIGE DUO

FAO 460-480

SZEMES

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



16



26-29



300-320 g

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Impozáns csövek

Kiváló szárstabilitás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

Az RGT VOLTIGE DUO (FAO 460-480) kínálatunkat keresse a KITE Zrt. partnerüknél.

RGT ELARAXX DUO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 8
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



28-30



360-400 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Klasszikus	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület		<70	65
			Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
					100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 520-540

SZEMES és SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Kettőshasznosítású
- Jó korai fejlődési erély
- Magas betegség-ellenállóság
- Impozáns, robosztus csövek
- Jó szem-csutka arány (mélyen ülő szemek)
- Dőlésre nem érzékeny



WAXY KUKORICA KÍNÁLATUNK



RGT HOXEGOR WAXY

FAO 460-480

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Jó korai fejlődési erély
- Korai virágzás
- Minden termőhelyre ajánlott

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



30-32



330-340 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Klasszikus	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület		<70	68
			Normál adottságú termőterület		70-100	68-70
					100-130	70-72
			Kiváló adottságú termőterület		>130	72



SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA KÍNÁLATUNK

ÚJ

RGT DUXXBURY

FAO 150-160

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony-középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



14-16



20-24



280-290 g

FŐ JELLEMZŐI


Kiváló korai fejlődési erély

Jó szárstabilitás

Nagyon jó termékenyülés

Stabil teljesítmény

Másodvetésre is ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület	<70	68
		Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
			100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület	>130	72

RGT ALYXX

FAO 210-230

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 8
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 8
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



14



30-32



305-310 g

FŐ JELLEMZŐI

Kiemelkedő szárstabilitás

Kiváló adaptációs képesség a különböző termelési adottságokhoz

Nagyon gyors vízleadás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület	<70	65
		Normál adottságú termőterület	70-100	65-68
			100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület	>130	72



ÚJ

RGT PETERXXON

FAO 270-280

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony
- Csőízesülés magassága közepes

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 8

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



26-28



290-310 g

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Szabályos csőalakulás

Széles éghajlati adottságok közé ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Klasszikus	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	68
			Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
				100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72

RGT AUXKAR

FAO 300-310

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas
- Csőízesülés magassága közép magas-magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



34-36



310-330 g

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Flexibilis csőtípus

Gyengébb termőhelyekre is ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Flexibilis	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	65
			Normál adottságú termőterület	70-100	65-68
				100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72

RGT DEXTER

Kizárólagos forgalmazó: IKR Agrár Kft.

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Flexibilis		Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



26-28



350-370 g

FAO 300-320

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Korai virágzás jellemzi
- Jó szárszilárdság, állóképesség
- Gyors vízleadás



RGT ZANETIXX

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

		Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Cső típus: Flexibilis	 Termés q/ha Tőzámsűrűség szem/ha	Gyenge adottságú termőterület	<70	68
		Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
			100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület	>130	72

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



34-38



350-380 g

FAO 340-350

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Kiváló stressztűrés és termőhelyi stabilitás
- Jó szárszilárdság
- Nagyon jó csőegészség
- A korai vetést is jól tűri



RGT PINXXFLOYD

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony-középmagas
- Csőízesülés magassága közepes

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



30-32



320-350 g

FAO 350-370

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kiváló kezdeti fejlődési erély

Jó szárszilárdság, állóképesség

Gyors vízleadás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70
			70-100	68-72
			Normál adottságú termőterület	100-130
			Kiváló adottságú termőterület	>130
				72

RGT TEXERO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony-középmagas
- Csőízesülés magassága alacsony-középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



30-32



320-350 g

FAO 370-380

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kimagasló termőképesség a normál és gyengébb adottságú területeken

Kiváló stressztűrés és szárszilárdság

Nagyon jó csőegészség

Rendkívül gyors vízleadás

A korai vetést is jól tűri



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70
			70-100	65-68
			Normál adottságú termőterület	100-130
			Kiváló adottságú termőterület	>130
				72

RGT ALEXX

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas-magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



38-40



340-360 g

FAO 370-380

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Jó kezdeti fejlődési erély
- Flexibilis csőtípus
- Jó termékenyülés
- Zöldszáron érés
- Stabil szár, dőlésre nem érzékeny
- Gyengébb termőhelyekre is ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Flexibilis	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	65
			Normál adottságú termőterület	70-100	65-68
				100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72

ÚJ

RGT MOGABRIX

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



28-30




340-360 g

FAO 370-390

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

- Korai virágzás
- Kiváló szárszilárdság
- Zöldszáron érés
- Magas ezermagtömeg
- Kiemelkedő termőképesség stabilitás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Klasszikus	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	68
			Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
				100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72



RGT OXANDRO

Kizárólagos forgalmazó: IKR Agrár Kft.

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



32-36



340-360 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

		Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Cső típus: Fix		Gyenge adottságú termőterület	<70	65
		Normál adottságú termőterület	70-100	65-68
			100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület	>130	72

FAO 370-390

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Egyenletes csőízesülési magasság

Kiváló szem-csutka arány

Kiváló csőtermékenyülés

Széles környezeti adottságok mellé ajánlott



RGT DRAGSTER

Kizárólagos forgalmazó: IKR Agrár Kft.

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas
- Csőízesülés magassága alacsony

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



36-40



350-370 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

		Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Cső típus: Flexibilis		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 380-400

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kiváló termőképesség minden termőhelyen

Nagyon jó évjáráti stabilitás

A stresszes területeken is átlag fölött terem

Erős szárszilárdsággal rendelkezik

Intenzív körülmények között jól sűrítendő



RGT PALAWAN

FAO 380-400

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közép magas-magas
- Csőízesülés magassága alacsony-közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



35-37



350-370 g

FŐ JELLEMZŐI

Nagy termőképesség

Impozáns csőalakulás

Stabil szár

Kiemelkedő csőegészség

Jó adottságú és intenzív technológia mellé ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Flexibilis	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	68
		Normál adottságú termőterület		70-100	68-72
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

ÚJ

RGT EVOLUXXION

FAO 400-420

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony-közép magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



30-32



350-370 g

FŐ JELLEMZŐI

Korai virágzás

Kiváló betegség-ellenállóság

Magas ezermagtömeg



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Klasszikus	Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	68
		Normál adottságú termőterület		70-100	68-72
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72



RGT DARKNESS

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság alacsony
- Csőízesülés magassága alacsony-középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18



34-40



360-380 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	 Termés q/ha Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 440-450

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Stressztűrő

Közepes-jó, korai fejlődési erély

Korai virágzás

Homogén csőalakulás

Rugalmasan vethető minden termőhelyi adottság mellett



RGT URBANIX

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága alacsony

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



35-37



350-370 g

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha  Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

FAO 440-460

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

17 t/ha fölötti termésopotenciál

Minden termőhelyre ajánlott

Felálló, sötétzöld levélzet

Hosszú, vastag csövek, végük kúposan elvékonyodik

Kiváló alkalmazkodóképesség és stressztűrés

Nagyon jó szárszilárdság

Intenzív körülmények között jól sűrítethető



RGT HUXXO

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága középmagas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18



39-41



370-390 g

FAO 480-490

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Közepes-jó korai fejlődési erély

Robosztus, fix csővű

Kitűnő szárszilárdság

Kiemelkedő termőhelyi és évjáráti stabilitás

Kiemelkedő csőegészsége miatt alacsony a toxinkockázat



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Fix Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület	<70	68
		Normál adottságú termőterület	70-100	68-72
			100-130	72-75
		Kiváló adottságú termőterület	>130	75

RGT MEXINI

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság középmagas
- Csőízesülés magassága alacsony

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16



32-34



350-360 g

FAO 480-490

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kiemelkedő évjáráti és termőhelyi stabilitás

Kiváló aszálytűrés

Magas csőbetegségekkel szembeni ellenálló képesség



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület	<70	68
		Normál adottságú termőterület	70-100	70-72
			100-130	72-75
		Kiváló adottságú termőterület	>130	75

KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA KÍNÁLATUNK

RGT SMARTBOXX

FAO 260-290

SZEMES ÉS SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság közepes-magas
- Csőízesülés magassága közepes

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 8
- Vízleadás 8
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



14-16



26-30



280-300 g

FŐ JELLEMZŐI

Siló profil

Jó korai fejlődési erély

Szabályos csőalakulás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	 Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	68
		Normál adottságú termőterület		70-100	68-72
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

RGT EXXACT

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 10
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 10
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 9

CSŐ JELLEMZŐK



16



28-30



320-340 g

FAO 290-310

SZEMES és SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Szemes és siló hasznosítás

Kiváló kezdeti fejlődésű

Gyors vízleadás

Hosszú, vékony csövek



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
Csőfajta: Klasszikus 	Gyenge adottságú termőterület	<70	68
	Normál adottságú termőterület	70-100	68-70
		100-130	70-72
	Kiváló adottságú termőterület	>130	72



RGT PAREXX

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 8
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 8
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



30-34



320-350 g

FAO 440-460

SZEMES ÉS SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Jó kezdeti fejlődési erély

Jó betegség-ellenállóság

Jó teljesítmény kedvező termesztési körülmények között

Magas emészthetőségű és tápértékű siló



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Fix	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	65
			Normál adottságú termőterület	70-100	65-68
				100-130	68-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72

RGT AXTRONAUTA

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága közép magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 8
- Vízleadás 8
- Aszálytűrés 8
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



28-30



350-370 g

FAO 460-480

SZEMES ÉS SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Jó betegség-ellenállóság és szárszilárdság

Silóként is felhasználható

Átlagos és jó adottságú területekre ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőfajta: Klasszikus	Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok	Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
			Gyenge adottságú termőterület	<70	68
			Normál adottságú termőterület	70-100	68-70
				100-130	70-72
			Kiváló adottságú termőterület	>130	72

ÚJ

RGT IXXEL

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 8
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 8
- Szárszilárdság 8
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



34-36



350-370 g

FAO 580-600

SZEMES ÉS SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Jó korai fejlődési erély

Jó betegség-ellenállóság

Átlagos és jó adottságú területekre ajánlott

Kettőshasznú



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Fix Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	65
		Normál adottságú termőterület		70-100	65-68
				100-130	68-72
		Kiváló adottságú termőterület		>130	72

SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA KÍNÁLATUNK

RGT SIRENIXX

FAO 480-500

SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága közép magas-magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 10
- Felszáradás lassú

CSŐ JELLEMZŐK



18-20



28-30



340-360 g

FŐ JELLEMZŐI

Jó kezdeti fejlődés

Siló hasznosítás

Zöldszáron érés

Kiváló minőségű és beltartalmi értékű takarmány alapanyag

Kiváló csőegészsége miatt alacsony a toxinkockázat

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Csőtípus: Klasszikus Termés q/ha	Tőszámsűrűség szem/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
		Gyenge adottságú termőterület		<70	70
		Normál adottságú termőterület		70-100	70-75
				100-130	75-80
		Kiváló adottságú termőterület		>130	80



MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 9
- Vízleadás 9
- Aszálytűrés 10
- Kezdeti fejlődési erély 8
- Szárszilárdság 10
- Csőegészség 10

CSŐ JELLEMZŐK



14-16



32-34



380-390 g

FŐ JELLEMZŐI

Magas szárazanyag hozam

Kiváló szárstabilitás



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Fix Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
	Gyenge adottságú termőterület		<70	70
	Normál adottságú termőterület		70-100	70-75
			100-130	75-85
	Kiváló adottságú termőterület		>130	80

MORFOLÓGIA

- Növénymagasság magas
- Csőízesülés magassága közép magas-magas

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség 10
- Vízleadás 6
- Aszálytűrés 9
- Kezdeti fejlődési erély 9
- Szárszilárdság 9
- Csőegészség 10
- Felszáradás lassú

CSŐ JELLEMZŐK



16-18



38-42



340-350 g

FŐ JELLEMZŐI

Robosztus növény

Magas zöldtömeg potenciál [**>53 t**]

Siló hasznosítás

Kitűnő silóbeltartalmi értékek

Jó kezdeti fejlődés



AJÁNLOTT TŐSZÁM

Cső típus: Fix Termés q/ha	Termesztési adottságok		Termésszínvonal q/ha	Tőszám ajánlás szem/10m ² Sortávolság 75-80 cm
	Gyenge adottságú termőterület		<70	70
	Normál adottságú termőterület		70-100	70-75
			100-130	75-85
	Kiváló adottságú termőterület		>130	80

TÖBB, MINT EGY ÉVSZÁZAD TUDÁSA, 20 ÉV MAGYAR SZAKÉRTELEMMEL

Az RAGT világszerte nemesít és forgalmaz vetőmagot. A legfontosabb szántóföldi, takarmány- és zöldség-növények fejlesztésével **Európa- és világszerte** segítjük a gazdákat abban, hogy még jobb, ellenállóbb és nagyobb teljesítményű fajtákhoz jussanak. Magyarországon immár két évtizede dolgozunk együtt a termelőkkel, hogy a legjobb hibrideket és technológiai újításokat biztosítsuk számukra. A **Deleplanque beolvasásával** vállalatunk tovább erősödött: nemcsak méretben, hanem **tudásban és portfólióban is nagyot léptünk előre**. A cég integrálásával olyan kulcskultúrák kerültek a kínálatunkba, mint a cukorrépa így még teljesebb, több szegmensre kiterjedő fajtakinálattal tudjuk támogatni a termelőket. Küldetésünk változatlan: innovációval és megbízhatósággal építjük a jövő mezőgazdaságát. A mezőgazdaság elkötelezett partnereként folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan hatékony és fenntartható megoldásokat fejlesszünk, amelyek valódi választ adnak a holnap kihívásaira.




							
TOP 3 A CUKORRÉPA ÉRTÉKESÍTÉSÉN	TOP 3 GABONAFÉLÉK TEÜLETÉN	A VILÁG VEZETŐ SÖRÁRPÁJA	EURÓPA VEZETŐ NÖVÉNYI-FEHÉRJE NÖVÉNY TERMELŐJE	A LEGSZÉLESEBB PORTFÓLIÓ A KUKORICA ÉS KÁPOSZTAREPCE TERÜLETÉN	A TALAJEGÉSZSÉG ÉS A FENNTARTHATÓ NÖVÉNYTERMESZTÉS SZAKÉRTŐJE	26 KUTATÓÁLLOMÁS	17 IPARI LÉTESÍTMÉNY

SOKSZÍNŰSÉG ÉS EGYMÁST KIEGÉSZÍTŐ PORTFÓLIÓ MEGOLDÁSOK MINDEN TERMELŐI IGÉNYRE

FORGALOM MEGOSZLÁSA KULTÚRACSOPORTOK SZERINT

JELENLÉT 50 ORSZÁGBAN, 4 MÁRKANÉV ALATT:

30%	KUKORICA & CIROK
19%	CUKORRÉPA
18%	GABONAFÉLÉK
16%	OLAJ- & FEHÉRJENÖVÉNYEK
11%	TAKARMÁNY, ZÖLDÍTŐ, PÁZSITNÖVÉNYEK
6%	ZÖLDSÉGEK



20

éves magyarországi jelenlétünk alkalmából szeretnénk meglepni partnereinket.
Olvassa be a QR-kódot, és azonnal kiderül, hogy Ön is a nyerteseink közé tartozik-e.



SZKENNELJ BE!

NAPRAFORGÓ





#THINKSOLUTIONSTHINKRAGT

THINK SOLUTIONS THINK RAGT



Az ökológiai gazdálkodás (biológiai gazdálkodás) alapja az ökológiai vetőmag. Az ökogazdálkodásra vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik az ökológiai vetőmagok használatát.

Az RAGT-nél a szigorú előírások betartásával történik az ökológiai (bio) vetőmagok előállítása:

- ☉ Az **AB** (Agriculture Biologique) minősítésű telepeken, a termelésben engedélyezett tápanyagutánpótlás mellett zajlik az előállítás. A szintetikus növényvédőszer helyett egyrészt mechanikus gyomirtással, másrészt a biológiailag engedélyezett eszközökkel történik a kártevőirtás, a vetőmagok tisztaságának és egészségi állapotának megőrzése érdekében.
- ☉ Az ökológiai gazdálkodásból származó vetőmagok osztályozását és zsákolását egy AB által akkreditált gyárban végzik.

Miért is előnyös az öko vetőmagok használata?

- ☉ Mert ezáltal egy konvencionálistól, tehát mesterséges anyagoktól (pl. növényvédőszerektől) független ökológiai gazdálkodás és ellátási lánc (termőföldtől az asztalig) jöhet létre.
- ☉ Az öko vetőmagok vásárlásával támogatja az ökológiai termesztésben használható fajtákkal kapcsolatos kutatásokat és az ökológiai nemesítést.
- ☉ Az ökológiai vetőmagok előállítása sokkal nehezebb és bonyolultabb, mint a konvencionális (csávázott) vetőmagoké, így már a vetőmag előállítására is olyan fajtákat választanak, melyek ellenállóak és illeszkednek az ökológiai rendszerekbe, melynek következtében ezek a fajták nagyobb valószínűséggel teljesítenek jól a termesztés során is.

A kiterjedt kutatási és szelekciós munkának köszönhetően az RAGT új megoldásokat fejlesztett a kései peronoszpóra fertőzések elleni védelemben.

Az új **GeneCare** termékjelöléssel ellátott hibridek, olyan magasfokú genetikai toleranciát képviselnek a betegséggel szemben, amely lehetővé teszi a hatékony védekezést, ezáltal a magasabb terméshozam elérését.

A cég napjainkra olyan napraforgó hibrideket tud a partnerei számára javasolni, amelyek magas terméspotenciáljuk mellett magas olajtartalommal is rendelkeznek. Ez pedig egy különösen száraz évben, amikor az átlagosnál alacsonyabb termés várható, plusz profit elérését teszi lehetővé. Az „**OLAJ +**” szimbólummal ellátott hibridek olajtartalma rendszerint több mint 2 százalékkal a piaci átlag felett van.



Az **A.I.R.™** egy új technológia, amely a hagyományos megoldások mellett rugalmasságot ad a gyomirtási módszerek megválasztásában, ezáltal széles spektrumú ellenállást nyújt a napraforgóban alkalmazott ALS-gátló (AHAS) herbicidekkel szemben.

Az **A.I.R.™** technológia a fajtát kettős ellenálló képességgel ruházza fel az imazamox- és tribenuron-metil alapú gyomirtó szerekkel szemben.

Az **A.I.R.™** fajta különlegessége, hogy minden, napraforgóra engedélyezett gyomirtóval kezelhető.





A **VIGOR plus** szimbólum egy olyan genetikai tulajdonságot jelöl, amelyet több éven át (legalább 3 évig) vizsgálnak az egyes hibridekben.

A VIGORplus-os hibrid tulajdonságai:

☑ **Intenzív fejlődés**

A növények kevesebb ideig vannak kitéve a kártevők káros behatásainak.

☑ **Homogén kelés**

A növények egyforma fejlettségűek.

☑ **Kiváló gyomelnyomó-képesség**

A növények gyors sorzáródásának köszönhetően a gyomosodás mértéke csökken.

A VIGORplus-os hibridek előnye a kontrollhoz képest




Kontroll

+13%-kal

HATÉKONYABB KELÉS
A KONTROLLHOZ KÉPEST

+6%-kal

MAGASABB
TERMÉSPOTENCIÁL
A KONTROLLHOZ KÉPEST



Piaci átlag

RAGT hibridek

ÁTLAGOS KÜLÖNBSÉG AZ RAGT
ÉS A VERSENYTÁRS HIBRIDEK
KÖZÖTT:

+2,18 % OLAJTARTALOM

Forrás: RAGT Semence adatbázis – 943 helyszín



BIO (ökológiai) NAPRAFORGÓ KÍNÁLATUNK

RGT BUFFALO BIO

KORAI-KÖZÉPKORAI

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	10
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	10
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA



FŐ JELLEMZŐI

Kitűnő korai fejlődési erély

Magas betegségellenállóság

Magas olaj- és olajsav tartalom

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha



RGT ANGELLO BIO


KÖZÉPKORAI

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	10
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	10
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA



FŐ JELLEMZŐI

Gyors fejlődésű

RM 9-es peronoszpóra rezisztencia

Magas napraforgó rozsdával szembeni tolerancia

Átlagon felüli tányérszklerotíniával szembeni ellenállóság

Magas olaj és olajsav tartalom

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha



LINOLSAVAS NAPRAFORGÓ KÍNÁLATUNK

ÚJ

RA1049266 AR

KORAI-KÖZÉPKORAI

LINOLSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	9
- Kezdeti fejlődési erély	8
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	9
- Szádor rezisztencia	A-E
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA




FŐ JELLEMZŐI

A.I.R™ technológia

Magas termés potenciál

Kimagasló betegség-ellenállóság



AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-62 ezer termőtő/ha



RGT VOLLTER SU


KORAI-KÖZÉPKORAI

LINOLSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	9
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	9
- Szádor rezisztencia	A-G
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9

MORFOLÓGIA



FŐ JELLEMZŐI

Középkorai, Express™ SX® (Tribenuron methyl) ellenálló napraforgó hibrid

Kiemelkedő korai fejlődési erély

RM9-es peronoszpóra rezisztencia

Szádorral szemben „A-G” rasszig rezisztens

Minden termőhelyre ajánlott



AJÁNLOTT TŐSZÁM

58-62 ezer termőtő/ha



Express™ SX®

Az Express™ és az SX® az FMC Corporation vagy leányvállalatának bejegyzett márkaneve.

RGT GALLAXY SX

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	9
- Kezdeti fejlődési erély	9
- Szárszilárdság	9
- Betegség ellenállóság	9
- Szádor rezisztencia	A-G
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha

MORFOLÓGIA



Express™ SX®

KORAI-KÖZÉPKORAI

LINOLSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

Express™ SX® technológia

Nagyon magas olajtartalom

Nagyon magas termés potenciál

Szádorrezisztencia „A-G”



Az Express™ és az SX® az FMC Corporation vagy leányvállalatának bejegyzett márkaneve.

ÚJ

RGT ELLIOTT CLP

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	9
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	8
- Betegség ellenállóság	8
- Szádor rezisztencia	A-F
- Peronoszpóra rezisztencia	RM7

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-62 ezer termőtő/ha

MORFOLÓGIA



Clearfield Plus
Gyomirtási Rendszer Napraforgóban

KÖZÉPKORAI

LINOLSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

Kiemelkedő flexibilitás

Jó korai fejlődési erély

Magas olajtartalom




A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

RGT ALLEGRO CLP

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	9
– Olajtartalom	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Betegség ellenállóság	9
– Szádor rezisztencia	A-E
– Peronoszpóra rezisztencia	RM9

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKORAI

LINOLSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

Alacsony növénymagasság

Kiemelkedő szárstabilitás

Nagyon magas olajtartalom



A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

AJÁNLOTT TŐSZÁM

60-65 ezer termőtő/ha

RGT VALLENCIA CLP

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Olajtartalom	10
– Aszálytűrés	8
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Betegség ellenállóság	10
– Szádor rezisztencia	A-G
– Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA



KÖZÉPÉRÉSŰ

LINOLSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

A középkorai éréscsoportba tartozó linolsavas CLP hibrid

Közepes növénymagasság

RM9+ (GeneCare) peronoszpóra rezisztencia

Szklerotíniával szemben (gyökér felett, száron) magas ellenállósággal rendelkezik

„A-G” rasszig szádor rezisztens



A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha



Tartós szárazság és a virágzáskori hőstressz (35 °C feletti hőmérséklet) esetén a hibridnél megnövekedhet a virágzat károsodásának és a termésdepresszióknak a kockázata.

MAGASOLAJSAVAS NAPRAFORGÓ KÍNÁLATUNK

RGT CHARLOTTE CL

KÖZÉPÉRÉSŰ

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	9
- Kezdeti fejlődési erély	9
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	9
- Szádor rezisztencia	A-E
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA



FŐ JELLEMZŐI

Magasolajsavas Clearfield® hibrid

Magas olaj- és olajsav tartalom

Dőlésre nem érzékeny

Kiemelkedő termékenyülés

RM9+ (GeneCare) peronoszpóra rezisztencia



A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

AJÁNLOTT TŐSZÁM

58-65 ezer termőtő/ha

RGT GUILLERMO CLP

KÖZÉPÉRÉSŰ

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	10
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	9
- Peronoszpóra rezisztencia	RM5

MORFOLÓGIA



FŐ JELLEMZŐI

Clearfield® Plusz technológia

Minden körülmények között TOP termés

Nagyon magas olajtartalom

Nagyon jó ellenállóság a gyökér- és szárdőléssel szemben

RM5 peronoszpóra rezisztencia

Kimagasló szár és tányér szklerotíniával szembeni ellenállóság



A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha

ÚJ

RGT BURRMA CLP

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	10
- Aszálytűrés	10
- Kezdeti fejlődési erély	9
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	9
- Szádor rezisztencia	A-F
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9+

MORFOLÓGIA



AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha



KÖZÉPÉRÉSŰ

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

Kiemelkedő terméspotenciál a Clearfield® Plus technológiában

Magasolajsavas

Teljes peronoszpóra rezisztencia



A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.

RGT LLUCIUS SX

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

- Termőképesség	10
- Olajtartalom	9
- Aszálytűrés	10
- Kezdeti fejlődési erély	10
- Szárszilárdság	10
- Betegség ellenállóság	10
- Peronoszpóra rezisztencia	RM9

MORFOLÓGIA



AJÁNLOTT TŐSZÁM

55-65 ezer termőtő/ha

Express™ SX®

KÖZÉPKÉSEI

MAGASOLAJSAVAS HIBRID

FŐ JELLEMZŐI

Express™ SX® technológia, H0 hibrid

Express toleráns napraforgóinkhoz viszonyítva közép magas

Magas olajsavtartalom

Nagyon jó szárszabítóság

Magas ezermagtömeg

RM9 peronoszpóra rezisztencia

Kimagasló szár és tányér szklerotíniával szembeni ellenállóság

Szádor rezisztens A-G rasszig



Az Express™ és az SX® az FMC Corporation vagy leányvállalatainak bejegyzett márkanév.

Tartós szárszilárdság és a virágzáskori hőstressz (35 °C feletti hőmérséklet) esetén a hibridnél megnövekedhet a virágzat károsodásának és a termésdepresszióknak a kockázata.

| **CIROK**





#THINKSOLUTIONSTHINKRAGT

RGT INDIGGO

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
 Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKORAI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Kimagasló termés a középkorai éréscsoportban

Kiváló szárstabilitás

Gyors vízleadás



RGT ICEBERGG

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	8
– Aszálytűrés	8
– Kezdeti fejlődési erély	8
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	9
– Betegség ellenállóság	9

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
 Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKORAI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ


FŐ JELLEMZŐI

Korai biztonságos betakaríthatóság

Egyedülállóan hófehér szemszín

Alacsony tannin tartalom

Jó betegségellenállóság



RGT HUGGO

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	9
– Betegség ellenállóság	9

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
 Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKORAI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas termőképességét nagy EMT-je is erősíti

Gyors bugafejlődése miatt hamar betakarítható

Vörös szemszín

Tanninmentes szemtermés



RGT ARMSTRONGG

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	9
– Pergési hajlam	9
– Betegség ellenállóság	9

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



közepes



félíg nyitott



vörös



28-32 g

KÖZÉPKORAI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Nagyon magas termésstabilitás

Minden terőhelyre ajánlott

Jó szárstabilitás



RGT AUGUSTO

Kizárólagos forgalmazó: PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	9

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



közepes



félíg nyitott



vörös



35-38 g

KÖZÉPKORAI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas ezermagtömeg

Jó szárstabilitás

Vörös szemszín

Tanninmentes szemtermés



RGT LEGGEND

Kizárólagos forgalmazó: IKR Agrár Kft.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



közepes



félíg nyitott



vörös



32-35 g

KÖZÉPÉRÉSŰ

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas terméspotenciál

Gyors vízleadó képesség

Vörös szemszín

Tanninmentes szemtermés



RGT ANGGY

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	9
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	8

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKÉSEI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Intenzív üzemi körülmények között az átlagtermés 9-11 t/ha is lehet

Könnyen betakarítható, megdőlésre nem hajlamos



RGT GGUSTAV

Kizárólagos forgalmazó: KITE ZRT.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	8

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **210-240 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **240-280 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKÉSEI

SZEMES HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Termőképessége a 10 t/ha-t is meghaladja

Könnyen betakarítható, megdőlésre nem hajlamos

Vörös szemszín



SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ CIROK KÍNÁLATUNK

RGT AMIGGO

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Energia tartalom	8
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **200-220 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **220-240 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



KÖZÉPKORAI

SILÓ ÉS BIOGÁZ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas termőképesség

Akár 4,5 méterre is megnő

Biomassza termelésre is kiváló



RGT VEGGA

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	9
– Energia tartalom	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	9
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **200-220 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **220-240 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



közepes (1,5-2 m)



félig nyitott



fehér



28-32 g

KÖZÉPÉRÉSŰ

SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas energiatartalom

Kiváló beltartalmi, emészthetőségi és takarmányozási érték

Tanninmentes szemtermés

Kitűnő szárszilárdság



ÚJ

RGT JOGGY

Kizárólagos forgalmazó: PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Kedvezőtlen adottságok: **200-220 ezer szem/ha**
Kedvező adottságok: **220-240 ezer szem/ha**

MORFOLÓGIA



magas (3,0-4,4 m)



nyitott



vörös



28-30 g

KÖZÉPKÉSEI

SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ

FŐ JELLEMZŐI

Magas zöld és szárazanyag hozam

Kiemelkedő szárstabilitás



ÚJ

RGT PORTHOS CIROK × SZUDÁNIFŰ HIBRID

AGRONÓMIAI JELLEMZŐK

– Termőképesség	10
– Aszálytűrés	10
– Kezdeti fejlődési erély	10
– Szárszilárdság	10
– Pergési hajlam	10
– Betegség ellenállóság	10

AJÁNLOTT TŐSZÁM

Silónak, dupla gabona sortávra vetve: **25-50 kg/ha**
Szénának, gabona sortávra vetve: **40-50 kg/ha**

MORFOLÓGIA



magas (2,0-2,4 m)



nyitott



vörös



15-18 g

KORAI

SILÓ HASZNOSÍTÁSÚ


FŐ JELLEMZŐI

Magas zöld- és szárazanyag hozam

Leveles, gyors növekedési erélyű

Jó szárstabilitás

Erős regenerációs képesség több vágás után is.



RAGT HIBRID AJÁNLAT 2026

Kukorica	Hasznosítás Siló/Szemes	FAO szám	Termő- képesség	Vízleadás	Aszálytűrés	Kezdeti fejlődési erély	Szár- szilárdság
RGT EXXKI DUO	szemes	310-320	10	10	10	9	10
RGT ZANETIXX DUO	szemes	340-350	9	10	10	9	10
RGT KARTELO DUO	szemes	370-390	10	10	10	9	10
RGT FUTURIXX DUO	szemes/siló	380-390	9	10	10	10	9
ÚJ! RGT PRODUXXION DUO	szemes	390-410	10	9	8	10	10
RGT HEXXAGONE DUO	szemes	400-420	9	9	9	10	10
RGT ODILIXX DUO	szemes	410-430	10	9	9	9	9
RGT EXXEMPLAIR DUO	szemes/siló	430-450	10	9	9	9	9
RGT CADIXXIO DUO	szemes	460-480	10	10	7	9	9
RGT VOLTIGE DUO (KITE Zrt.)	szemes	460-480	10	9	8	9	10
RGT ELARAXX DUO	szemes/siló	520-540	10	8	10	9	10
RGT HOXEGOR WAXY	WAXY	460-480	10	9	10	9	10
ÚJ! RGT DUXXBURY	szemes	150-160	10	10	8	10	10
RGT ALYXX	szemes	210-230	8	10	10	8	10
ÚJ! RGT PETERXXON	szemes	270-280	10	10	10	9	10
RGT AUXKAR	szemes	300-310	10	10	10	10	10
ÚJ! RGT DEXTER (IKR Agrár Kft.)	szemes	300-320	10	10	10	9	10
RGT ZANETIXX	szemes	340-350	9	10	10	9	10
ÚJ! RGT PINXXFLOYD	szemes	350-360	10	10	8	10	9
RGT TEXERO	szemes	370-380	10	10	10	10	10
RGT ALEXX	szemes	370-380	10	10	10	10	9
ÚJ! RGT MOGABRIX	szemes	370-390	10	10	10	10	10
RGT OXANDRO (IKR Agrár Kft.)	szemes	370-390	10	10	10	10	10
RGT DRAGSTER (IKR Agrár Kft.)	szemes	380-400	10	10	10	9	10
RGT PALAWAN	szemes	380-400	10	9	9	10	10
ÚJ! RGT EVOLUXXION	szemes	400-420	10	10	10	9	9
RGT DARKNESS	szemes	440-450	10	10	10	10	10
RGT URBANIX	szemes	440-460	10	9	10	9	10
RGT MEXINI	szemes	480-490	10	9	10	10	10
RGT HUXXO	szemes	480-490	10	9	10	10	10
ÚJ! RGT SMARTBOXX	szemes/siló	260-290	8	8	8	9	10
RGT EXXACT	szemes/siló	290-310	10	10	9	10	9
RGT PAREXX	szemes/siló	440-460	10	8	8	8	10
RGT AXXTRONAUTE	szemes/siló	460-480	8	8	8	9	10
ÚJ! RGT IXXEL	szemes/siló	580-600	10	8	10	8	8
RGT SIRENIXX	siló	480-500	9	8	9	9	9
ÚJ! RGT IXABEL	siló	540-560	9	9	10	8	10
RGT FARAONIXX	siló	550-570	10	6	9	9	9

Csőegység	Növény magasság	Csőízesülés	Sorok száma	Szemszám	E. M. T.	Ajánlott tőszám	DUO System® változatban is
9	középmagas	középmagas	14	28-30	300-320 g	70-75 ezer termőtő/ha	Igen
10	középmagas	középmagas	16-18	34-38	320-330 g	68-72 ezer termőtő/ha	Igen
8	középmagas	középmagas	14-16	38-42	320-360 g	65-77 ezer termőtő/ha	Igen
10	magas	magas	16	38-40	340-360 g	65-72 ezer termőtő/ha	Igen
8	középmagas-magas	középmagas	18-20	28-30	310-340 g	68-72 ezer termőtő/ha	Igen
10	alacsony	alacsony	16	32-36	360-380 g	65-77 ezer termőtő/ha	Igen
9	középmagas-magas	középmagas-magas	18-20	30-32	330-360 g	65-72 ezer termőtő/ha	Igen
9	magas	középmagas	14-16	28-30	340-360 g	62-78 ezer termőtő/ha	Igen
8	középmagas	magas	18-20	32-36	360-400 g	65-72 ezer termőtő/ha	Igen
9	középmagas	középmagas	16	26-29	300-320 g	62-72 ezer termőtő/ha	Igen
9	magas	középmagas	16-18	28-30	360-400 g	65-72 ezer termőtő/ha	Igen
10	alacsony	középmagas	18-20	30-32	330-340 g	68-72 ezer termőtő/ha	
10	alacsony-középmagas	középmagas	14-16	20-24	280-290	68-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas	14	30-32	305-310 g	65-72 ezer termőtő/ha	
8	alacsony	középmagas	16-18	26-28	290-310	68-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas-magas	18-20	34-36	310-330 g	62-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas	18-20	26-28	350-370	65-68 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas	16-18	34-38	350-380 g	65-72 ezer termőtő/ha	Igen
9	alacsony-középmagas	középmagas	16-18	30-32	320-350	68-72 ezer termőtő/ha	
10	alacsony-középmagas	alacsony-középmagas	18-20	30-32	320-350 g	65-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas-magas	16-18	38-40	340-360 g	65-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas	18-20	28-30	340-360	68-72 ezer termőtő/ha	
10	alacsony	középmagas	16-18	32-36	340-360 g	65-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	alacsony	18-20	36-40	350-370 g	65-72 ezer termőtő/ha	
10	középmagas-magas	alacsony-középmagas	16-18	35-37	350-370	68-72 ezer termőtő/ha	
10	alacsony-középmagas	középmagas	16-18	30-32	350-370	68-72 ezer termőtő/ha	
10	alacsony	alacsony-középmagas	18	34-40	360-380 g	67-75 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	alacsony	18-20	35-37	350-370 g	67-75 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	alacsony	16	32-34	350-360 g	68-75 ezer termőtő/ha	
10	középmagas	középmagas	18	39-41	370-390 g	68-75 ezer termőtő/ha	
9	magas	magas	14-16	26-30	280-300 g	68-72 ezer termőtő/ha	
9	magas	magas	16	28-30	320-340 g	68-72 ezer termőtő/ha	
10	magas	magas	18-20	30-34	320-350 g	65-72 ezer termőtő/ha	
10	magas	középmagas	16-18	28-30	350-370	68-72 ezer termőtő/ha	
10	magas	magas	18-20	34-36	350-370	65-72 ezer termőtő/ha	
10	magas	középmagas-magas	18-20	28-30	340-360 g	70-80 ezer termőtő/ha	
10	magas	magas	14-16	32-34	380-390	70-80 ezer termőtő/ha	
10	magas	középmagas	16-18	38-42	340-350	70-85 ezer termőtő/ha	

RAGT HIBRID AJÁNLAT 2026

Napraforgó	Hasznosítás LO*/HO**	Gyomirtási technológia	Érésidő	Termő- képesség	Bónusz olaj	Aszály- tűrés	Kezdeti fejlődési erély
RGT BUFFALLO BIO	HO	hagyományos	korai-középkorai	10	10	10	10
RGT ANGELLO BIO	HO	hagyományos	középkorai	10	10	10	10
ÚJ! RGT RA1049266 AR	LO	AIR	korai-Középkorai	10	10	9	8
ÚJ! RGT ELLIOTT CLP	LO	CLP	középkorai	10	10	9	10
RGT VOLLTER SU	LO	SX	korai-középkorai	10	10	9	10
RGT GALAXY SX	LO	SX	korai-középkorai	10	10	9	9
RGT ALLEGRO CLP	LO	CLP	középkorai	9	10	10	9
RGT VALLENCIA CLP	LO	CLP	középérésű	10	10	8	9
RGT CHARLOTTE CL	HO	CL	középérésű	10	10	9	9
RGT GUILLERMO	HO	CLP	középérésű	10	10	10	10
ÚJ! RGT BURRMA CLP	HO	CLP	középérésű	10	10	10	9
RGT LLUCIUS SX	HO	SX	középkései	10	9	10	10

* LO: hagyományos olaj ** HO: magas olajsavas

Cirok	Hasznosítási irány	Érésidő	Termő- képesség	Szemszín	Siló beltartalom	Aszály- tűrés	Kezdeti fejlődési erély
ÚJ! RGT INDIGGO	szemes	középkorai	10	fehér		10	9
RGT ICEBERGG	szemes	középkorai	8	fehér		8	8
RGT HUGGO	szemes	középkorai	10	vörös		10	10
RGT ARMSTRONG	szemes	középkorai	10	vörös		10	9
RGT AUGGOSTO (Pannon-Mag-Agrár Kft.)	szemes	középkorai	10	vörös		10	9
RGT LEGGEND (IKR Agrár Kft.)	szemes	középérésű	10	vörös		10	10
RGT ANGGY	szemes	középkései	9	vörös		10	9
RGT GGUSTAV (KITEZrt.)	szemes	középkései	10	vörös		10	10
RGT AMIGGO	siló/biogáz	középkorai	10	vörös	8	10	10
RGT VEGGA	siló	középérésű	9	fehér	10	10	9
ÚJ! RGT JOGGY (Pannon-Mag-Agrár Kft.)	siló	középkései	10	vörös	8	10	10
ÚJ! RGT PORTHOS	siló	korai	10	vörös	8	10	10

Szár- szilárdság	Peronoszpóra rezisztencia	Betegség ellenállóság	Növény magasság	Tányérállás	E. M. T.	Ajánlott tőszám
10	RM9+	10	közepes	45°	55-60g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9+	10	közepes	180°	55-60g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9+	9	közepes	180°	58-65g	55-62 ezer termőtő /ha
8	RM7	8	közepes	180°	60-65g	55-62 ezer termőtő /ha
10	RM9	9	magas	45°	47-49g	58-62 ezer termőtő /ha
9	RM9	9	közepes	45°	55-60g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9	9	alacsony	45°	55-60g	60-65 ezer termőtő /ha
10	RM9+	10	közepes	180°	47-49g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9+	9	közepes	180°	44-47g	58-65 ezer termőtő /ha
10	RM5	9	magas	45°	55-60g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9+	9	magas	45°	60-65g	55-65 ezer termőtő /ha
10	RM9	10	közepes	45°	55-60g	55-65 ezer termőtő /ha

Szár- szilárdság	Pergési hajlam	Betegség ellenállóság	Növény magasság	Buga típusa	E. M. T.	Ajánlott tőszám
10	10	10	közepes	félíg nyitott	28-33g	210-280
10	9	9	közepes	félíg nyitott	28-30g	210-280
10	9	9	alacsony	félíg nyitott	32-35g	210-280
9	9	9	közepes	félíg nyitott	28-32g	210-280
10	10	9	közepes	félíg nyitott	35-38g	210-280
10	10	1	közepes	félíg nyitott	32-35g	210-280
10	10	8	alacsony	félíg nyitott	32-35g	210-280
10	10	9	alacsony	félíg nyitott	28-32g	210-280
10	10	10	magas	nyitott	28-32g	200-240
10	10	10	közepes	félíg nyitott	28-32g	200-240
10	10	10	magas	nyitott	28-30g	200-240
10	10	10	magas	nyitott	15-18g	





Bukovinszki Károly
értékesítési vezető
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 768 5898
E-mail: kbukovinszki@ragt.hu



Szemerits Balázs
fejlesztőmérnök
Budaörsi központ
Foglalkozási terület kukorica,
napraforgó, cirok,
őszi káposztarepce
Telefonszám: +36 30 535 8986
E-mail: bszemerits@ragt.hu



Mózes Petra Erika
termékmenedzser
Budaörsi központ
Foglalkozási terület kalászos,
szója, zöldítő keverék
Telefonszám: +36 30 492 1063
E-mail: phuszarnemozes@ragt.hu



Imre Veronika
marketing vezető
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 613 0582
E-mail: vimre@ragt.hu



Regász András
könyvelési supervisor
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 540 9452
E-mail: aregasz@ragt.hu



Gombos Judit
könyvelő
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 010 1640
E-mail: jgombos@ragt.hu



Tóth Adrienn
logisztikus
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 427 1064
E-mail: atoth@ragt.hu



Dosztál Zsófia
pénzügyi és logisztikai
asszisztens
Budaörsi központ
Telefonszám: +36 30 822 2826
E-mail: zdosztal@ragt.hu

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ



1 Baján László
régióvezető
Körzet Győr-Moson-Sopron,
Komárom, Veszprém, Zala
Telefonszám: +36 30 719 6343
E-mail: lbajan@ragt.hu



2 Ferenczi Zsolt
promóter
Körzet Győr-Moson-Sopron
Telefonszám: +36 30 822 2834
E-mail: ferencziszolt66@gmail.com



3 Gelencsér Bence
területi képviselő
Körzet Zala
Telefonszám: +36 30 579 0252
E-mail: bgelencser@ragt.hu



4 Rigó Krisztián
promóter
Körzet Vas
Telefonszám: +36 30 540 7146
E-mail: rigokrisztian72@gmail.com



16 Bogár Gábor
területi képviselő
Körzet Hajdú-Bihar, Heves,
Kelet-Jász-Nagykun-Szolnok
Telefonszám: +36 30 822 2819
E-mail: gbogar@ragt.hu



17 Kis Richárd
területi képviselő
Körzet Szabolcs-Szatmár,
Észak-Kelet-Hajdú-Bihar
Telefonszám: +36 20 344 1488
E-mail: rkis@ragt.hu




18 Urbán Zsolt
területi képviselő
Körzet Borsod-Abaúj-Zemplén
Telefonszám: +36 30 588 3192
E-mail: zurban@ragt.hu

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ



5 Juhos Péter
régióvezető
Körzet Somogy
Telefonszám: +36 30 536 1810
E-mail: pjuhos@ragt.hu



KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ



6 Beregi Endre
területi képviselő
Körzet Fejér
Telefonszám: +36 30 594 6753
E-mail: eberegi@ragt.hu



7 Hernádiné Baa Katalin
területi képviselő
Körzet Nyugat-Baranya,
Dél-Kelet-Somogy
Telefonszám: +36 30 255 3710
E-mail: khernadinebaa@ragt.hu



10 Monori Gábor
régióvezető
Körzet Pest, Nógrád
Telefonszám: +36 30 937 6231
E-mail: gmonori@ragt.hu



11 Ordasi Lajos
promóter
Körzet Dél-Pest, Nyugat-Jász-
-Nagykun-Szolnok
Telefonszám: +36 30 427 1106
E-mail: ordasil@gmail.com



13 Kovács Gábor
régióvezető
Körzet Békés
Telefonszám: +36 30 577 6261
E-mail: gkovacs@ragt.hu



14 Berczi Gábor
promóter
Körzet Békés
Telefonszám: +36 30 551 1674
E-mail: berczi.g@freemail.hu



8 Ludányiné Erdélyi Judit
területi képviselő
Körzet Nyugat-Tolna,
Észak-Kelet-Somogy
Telefonszám: +36 30 822 2820
E-mail: jludanyineerdelyi@ragt.hu



9 Vics Zsolt
területi képviselő
Körzet Baranya, Kelet-Tolna
Telefonszám: +36 30 594 7345
E-mail: zvics@ragt.hu



12 Szanyi-Molnár Regina Anna
promóter
Körzet Bács-Kiskun
Telefonszám: +36 30 472 7760
E-mail: regina.molnar90@gmail.com



15 Nagy Gábor
promóter
Körzet Csongrád
Telefonszám: +36 30 492 1256
E-mail: hodplantbt@gmail.com

KÖVESSEN MINKET:



www.ragt.hu

RAGT VETŐMAG KFT.
2040 Budaörs, Keleti utca. 7., 3. emelet
Telefon: 06 22 500 121 • E-mail: megrendeles@ragt.hu